



# innovazym<sup>®</sup>

## Datenliste zur LMIV innovazym

**PZN: 06816613**

### Zutaten:

Füllstoffe: Isomalt und mikrokristalline Cellulose, L-Ascorbinsäure, Füllstoff:

Hydroxypropylmethylcellulose, Traubenkernextrakt, Maltodextrin, Magnesiumoxid, Citrusextrakt, Papain, Ananassaftkonzentrat, Bromelain, D-alpha-Tocopherylacetat, Heidelbeerfruchtpulver, Zinkcitrat, Lysozymhydrochlorid (aus Hühnerei), Coenzym Q10, Trennmittel: Speisefettsäuren, Siliciumdioxid, Magnesiumsalze der Speisefettsäuren und Talkum, Polyfructose, Stabilisator: Gummi Arabicum, Retinylacetat, pflanzliches Öl (aus *Elaeis guineensis* L. und *Cocos nucifera* L.), Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Beta-Carotin, (6S)-5-Methyltetrahydrofolsäure Glucosaminsalz, Natriumselenat, Methylcobalamin.

Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.

### Nährwerttabelle:

	pro 100 g	Tagesration 7 Tabletten = 7175 mg	%NRV*
Brennwert in kJ	920,8	64,5	0,8
Brennwert in kcal	220,7	15,5	0,8
Fett in g davon gesättigte Fettsäuren in g	1,6 1,5	0,11 0,01	0,2 0,5
Kohlenhydrate in g davon Zucker in g davon mehrwertige Alkohole in g	43,9 2,4 34,8	3,1 0,17 2,4	1,2 0,2 **
Eiweiß in g	3,1	0,21	0,4
Salz in g	0	< 0,01	< 0,01

\* Prozentsatz des Referenzwertes nach Anlage XIII der LMIV (EG) Nr. 1169/2011

\*\* keine Empfehlung vorhanden

Nahrungsergänzungsmittel: Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.

### Verzehrempfehlung

Über den Tag verteilt 7 Mikronährstofftabletten auf nüchternen Magen 1 Stunde vor dem Essen bzw. 3 Stunden nach dem Essen mit reichlich kalter Flüssigkeit einnehmen. Die Tabletten sind mit einem magensaftresistenten Überzug versehen und können an der Bruchkerbe halbiert werden.

### Unser Tipp:

Morgens 3 Tabletten

Abends 4 Tabletten