



**Gebrauchsinformation**  
bitte sorgfältig lesen!

# Arnica / Symphytum comp.

## Salbe

### Zusammensetzung

10 g enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Aconitum napellus Ø 0,0375 g / 0,176 g ethanol. Auszug aus Arnica montana, Planta tota rec. (1:1,1) / Betulae folium, ethanol. Decoctum 20% (HAB, V. 12a und 19f) 0,05 g / Mandragora, ethanol. Decoctum Ø 0,33 g / 1,25 g ethanol. Decoctum aus Symphytum officinale, Radix rec. (1:4,2) / Mandragora e radice siccato H 10% (HAB, V. 12d) 0,25 g / Rosmarini aetheroleum 0,025 g / Resina Laricis 0,125 g.

Salbengrundlage: Raffiniertes Sesamöl, Wollwachs, Gelbes Wachs, Wollwachsalkohole, Gereinigtes Wasser.

### Darreichungsform und Packungsgrößen

25 g, 70 g Salbe

### Anthroposophisches Arzneimittel

Weleda AG

Postfach 1309/1320

D-73503 Schwäbisch Gmünd

### Anwendungsgebiete

gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis

Dazu gehören: Prellungen, Quetschungen, Zerrungen, Verstauchungen; Knochenbrüche; von der Knochenhaut ausgehende Schmerzen; chronisch-entzündliche und degenerative Gelenkerkrankungen.

Bei akuten Zuständen, die mit Rötung, Schwellung oder Überwärmung von Gelenken einhergehen, sowie bei andauernden oder periodisch wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte einen Arzt auf.

### Gegenanzeigen

*Wann dürfen Sie Arnica / Symphytum comp. Salbe nicht anwenden?*

Arnica / Symphytum comp. Salbe soll nicht angewendet werden bei Überempfindlichkeit gegen Arnika und andere Korbblütler oder gegen Bestandteile der Salbe.

Die Anwendung darf nur auf intakter Haut erfolgen.

### Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

*Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?*

Während der Schwangerschaft und in der Stillzeit sollte die Anwendung von Arnica / Symphytum comp. Salbe nur nach Rücksprache mit einem Arzt erfolgen.

### Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Keine bekannt



### **Dosierung und Art der Anwendung**

Soweit nicht anders verordnet, wird je nach Größe der betroffenen Körperpartie 1 - 3 mal täglich ein Salbenstrang von 1 - 5 cm Länge dünn aufgetragen und in die Haut eingerieben oder als Salbenverband aufgelegt. Bei Säuglingen und Kleinkindern im 1. Lebensjahr wird die Salbe nur einmal täglich dünn aufgetragen und in die Haut eingerieben.

Zur Anwendung als Salbenverband wird ein Stück Stoff oder Verbandmull so groß wie die zu behandelnde Fläche dünn mit Arnica / Symphytum comp. Salbe bestrichen; dieses wird auf die betroffene Körperpartie gelegt und z.B. mit einem Tuch befestigt. Der Salbenverband soll eine bis mehrere Stunden oder über Nacht liegen bleiben.

### **Dauer der Anwendung**

Arnica / Symphytum comp. Salbe soll nicht länger als 6 Wochen pro Jahr angewendet werden.

### **Nebenwirkungen**

Aufgrund des Gehaltes an Wollwachs können bei Anwendung dieses Arzneimittels Hautreaktionen (z.B. Kontaktdermatitis) auftreten.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

### **Hinweis**

Nach Ablauf des auf dem Behältnis und der äußeren Umhüllung angegebenen Verfalldatums sollte das Präparat nicht mehr angewendet werden.

**Stand der Information:** September 2002