

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

## Gebrauchsinformation

---

# Visc-Ophtal<sup>®</sup>

Wirkstoff: Carbomer  
Augengel

DR. WINZER

---

### Zusammensetzung

*Arzneilich wirksame Bestandteile:*

1 g Augengel enthält Carbomer (Viskosität 40.000–60.000 mPa·s) 2,0 mg.

*Sonstige Bestandteile:*

Cetrimid 0,1 mg (Konservierungsmittel), Sorbitol (Ph. Eur.), Natriumhydroxid (zur pH-Wert-Einstellung), Wasser für Injektionszwecke.

### Darreichungsform und Inhalt

Packung mit Tuben à 10 g bzw. 3 x 10 g Augengel

Tränenersatzmittel bei „Trockenem Auge“

---

**DR. WINZER PHARMA GMBH, Brunsbütteler Damm 165-173, 13581 Berlin;**

**Telefon: 0 30/3 30 93-100, Telefax: 0 30/3 30 93-3 05**

**E-Mail: medwiss@drwinzer.de**

---

### Anwendungsgebiete

Ersatz der Tränenflüssigkeit bei gestörter Tränenproduktion. Symptomatische Behandlung des „Trockenen Auges“.

### Gegenanzeigen

*Wann dürfen Sie Visc-Ophtal<sup>®</sup> nicht anwenden?*

Bei Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe darf Visc-Ophtal<sup>®</sup> nicht angewendet werden.

### Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

*Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden?*

Bei diesem Arzneimittel kann es nach dem Eintropfen in den Bindehautsack des Auges durch Schlierenbildung zu einem nur wenige Minuten andauernden Verschwommensehen kommen. In dieser Zeit sollten daher keine Maschinen bedient, keine Arbeiten ohne sicheren Halt ausgeführt und sollte nicht am Straßenverkehr teilgenommen werden. Kontaktlinsen sollten vor der Anwendung herausgenommen werden. Sie können 15 Minuten nach dem Eintropfen von Visc-Ophtal<sup>®</sup> wieder eingesetzt werden.

*Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?*

Mit Visc-Ophtal<sup>®</sup> sind zwar keine Untersuchungen an schwangeren Patientinnen durchgeführt worden, andererseits bestehen keine Verdachtsmomente, die gegen die Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit sprechen.

Das Carbomer wird nur zu einem sehr geringen Anteil (< 2%) resorbiert und ist somit systemisch praktisch nicht verfügbar.

Grundsätzlich sollte die Anwendung von Arzneimitteln während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach sorgfältiger Nutzen-Risiko-Abwägung durch den Arzt erfolgen.

### Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

*Welche anderen Arzneimittel beeinflussen die Wirkung von Visc-Ophtal<sup>®</sup> oder können in ihrer Wirkung durch Visc-Ophtal<sup>®</sup> beeinflusst werden?*

Bisher sind keine speziellen Wechselwirkungen bekannt.

### Hinweis:

Falls Sie zusätzlich jedoch andere Augentropfen/Augensalben anwenden, sollte zwischen deren Anwendung ein zeitlicher Abstand von ca. 5 Minuten eingehalten und Visc-Ophtal<sup>®</sup> stets als Letztes angewendet werden.

### Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die Therapie des trockenen Auges erfordert eine individuelle Dosierung.

Je nach Schwere und Ausprägung der Beschwerden 3- bis 5-mal täglich oder häufiger und vor dem Schlafengehen 1 Tropfen in den Bindehautsack eintropfen.

Visc-Ophtal® ist zur Dauertherapie geeignet.

Bei der Behandlung des „Trockenen Auges“, die in der Regel als Langzeit- und Dauertherapie erfolgt, sollte ein Augenarzt konsultiert werden.

#### Hinweis:

Um eine Verunreinigung von Tropferspitze und Augengel zu vermeiden, darf weder das Augenlid noch die Augenumgebung oder andere Oberflächen mit der Tropferspitze in Berührung kommen.

#### Nebenwirkungen

*Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Visc-Ophtal® auftreten?*

In Einzelfällen kann es zu einer Unverträglichkeitsreaktion gegen einen der Inhaltsstoffe kommen. Visc-Ophtal® enthält das Konservierungsmittel Cetrimid, das insbesondere bei häufigerer Anwendung Reizungen des Auges (Brennen, Rötungen, Fremdkörpergefühl) hervorrufen und das Hornhautepithel schädigen kann.

*Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen?*

Sollten Überempfindlichkeitsreaktionen oder Reizungen am Auge auftreten, unterbrechen Sie bitte die Behandlung und suchen Sie Ihren Arzt auf.

Hinweis: Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage genannt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

#### Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Arzneimittel ist in unversehrter Packung 3 Jahre haltbar.

Das Arzneimittel darf nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden (siehe Faltschachtel und Tubenfalz).

Das Augengel darf nach Anbruch nicht länger als 6 Wochen verwendet werden.

#### Stand der Information

April 2005

---

#### Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Apothekenpflichtig

Zul.-Nr. 40611.00.00

#### Eigenschaften


Visc-Ophtal® ist tropffähig und somit leicht und bequem anzuwenden.

Bitte halten Sie beim Tropfen die Tube senkrecht, so entsteht ein kleiner Tropfen, der sich leicht von der Tubenspitze löst. Visc-Ophtal® eignet sich durch seine hohe Viskosität insbesondere zur Behandlung auch schwerer Symptome des „Trockenen Auges“. Es bildet einen Schutzfilm von hoher Haftfähigkeit und -dauer und hält Horn- und Bindehaut lange feucht, so dass bei schweren Fällen nur relativ wenige Applikationen (im Schnitt 3–5/Tag) zur Linderung der Beschwerden und Besserung des Zustandes ausreichen.


Visc-Ophtal® ist sehr gut verträglich und hat einen erfrischenden, kühlenden Effekt. Es kann, je nach Bedarf, auch häufiger verwendet werden.

#### Bitte beachten!


#### Handhabungshinweis:



falsch



richtig



Eine angenehme und therapiegerechte Tropfengröße wird dann erreicht, wenn die Tube beim Tropfen senkrecht über das Auge gehalten wird – siehe auch Pfeilrichtung unter dem Tubenfalz –.

Ziehen Sie dazu das Augenlid leicht nach unten und schauen Sie dabei nach oben.

**DR. WINZER PHARMA GMBH, 13581 Berlin**