


# Mundgel aldiamed

Speichelerganzung



 Bitte Gebrauchsinformation aufmerksam lesen

## Anwendungsgebiet

**aldiamed Mundgel ist ein lang anhaltendes Feuchtigkeitsgel zur Behandlung bei Mundtrockenheit fur die Nacht.**

## Wirkweise

aldiamed Mundgel verleiht eine fur Stunden andauernde, **angenehme Befeuchtung** im Mund. Dadurch **beugt es Reizungen und Entzundungen im Mundraum vor** und unterstutzt den naturlichen Schutz in der Mundhohle.

Die angenehm dickflussige Konsistenz sorgt dafur, dass sich das Mundgel lang anhaltend wie ein Schutzfilm auf die Mundschleimhaut legt und diese **sehr gut vor dem Austrocknen schutzt**.

## Ursachen der Mundtrockenheit

Die Intensitat der Speichelproduktion ist von Mensch zu Mensch verschieden ausgepragt und nimmt mit zunehmendem Alter meist ab.

Sie ist Schwankungen unterworfen, die z. B. auf einen starken Flussigkeitsmangel zuruckzufuhren sind (ungenugendes Trinken). Zudem kann der Speichel durch

Erkrankungen wie Diabetes mellitus oder Sjogren-Syndrom, Strahlentherapien, Medikamenteneinnahme, verminderte Kau-tatigkeit, Stress, psychische Probleme, Rauchen sowie Mundatmung (bei Erkaltung oder Schnarchen) verringert sein.

## Die Rolle des Speichels

Der Speichel des Menschen erfullt zahlreiche wichtige Funktionen. So befeuchtet er zunachst die Mundhohle, wodurch Sprechen, Kauen und Schlucken erst moglich werden. Weiterhin schutzen die im Speichel enthaltenen Enzyme den Mundraum vor schadlichen Bakterien. Wird nicht genugend Speichel produziert konnen Entzundungen in der Mundhohle, schlechter Atem und Zahnprobleme entstehen.

## Anwendung

Wenden Sie aldiamed Mundgel abends und nachts an. Bei Bedarf konnen Sie die Anwendung mehrmals wiederholen.

Sie konnen aldiamed Mundgel mit einem sauberen Finger oder einem Wattestabchen unmittelbar auf das Zahnfleisch oder die besonders trockenen Bereiche im Mund auftragen.

Um Ihre Mundhöhle komplett zu benetzen, können Sie auch 1–2 cm **aldiamed Mundgel** auf die Zunge legen und gleichmäßig mit der Zunge im Mundraum verteilen.

**Hinweise**

Der Zeitraum der Befeuchtung hängt von subjektiven Faktoren ab. Trinken oder ein geringer Restspeichelfluss können das Gel schneller aus dem Mund spülen. Für eine langanhaltende Wirkung empfehlen wir, das Gel vor dem Zubettgehen aufzutragen.



**aldiamed Mundgel** ist auch für Diabetiker und für Träger von Zahnprothesen geeignet.

**Zusammensetzung:** Wasser, Glycerol, Sorbitol, Aloe vera, Glycerylpolyacrylat, Lactoferrin, Lysozym, Natriumhydroxid zur pH-Wert-Einstellung, Xanthan, Xylitol

**Gegenanzeigen:** Nicht anwenden bei einer bekannten Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe. Nicht auf versehrter Mundschleimhaut anwenden.

**Neben-/Wechselwirkungen:** **aldiamed Mundgel** ist im Allgemeinen ein sehr gut verträgliches Produkt. Bei Überdosierung (mehr als eine 50g-Tube täglich oder mehr als 20 Einmalsachets) ist eine abführende Wirkung möglich.

**Weitere aldiamed-Produkte**

Gerade bei Mundtrockenheit ist eine gute Mundhygiene besonders wichtig. Dazu gehört auch die regelmäßige Anwendung einer Mundspülung. Bei trockenem Mund sollte diese die empfindliche Mundschleimhaut nicht zusätzlich reizen.

Daher hat die **aldiamed Mundspülung** eine milde Rezeptur und enthält keinen Alkohol. Sie reinigt und schützt Zähne und Mundschleimhaut sehr gut. Dank der leicht dickflüssigen Konsistenz befeuchtet sie den Mundraum auch kurzfristig.

Zur Befeuchtung des trockenen Mundes für unterwegs und zwischendurch empfehlen wir **aldiamed Mundspray**.

**Die aldiamed-Produkte**

**Mundgel: 50 g-Tube**

PZN (D): 00879268

PZN (AT): 3888517



**Mundgel: 50 x 2 ml Sachets**

PZN (D): 14853752,

(AT): 4918976

**Mundspülung: 250 ml**

PZN (D): 00879239


PZN (AT): 3888523



**Mundspray: 50 ml**

PZN (D): 09397022

PZN (AT): 3887021



Certmedica International GmbH  
Magnolienweg 17, 63741 Aschaffenburg



Haben Sie noch Fragen oder Anregungen? Tel.: +49 60 21 / 15 09 3 - 380

[www.aldiamed.de](http://www.aldiamed.de)

Stand der Information: 2019-12



Verfallsdatum beachten



Haltbarkeit nach Anbruch der Tube:  
6 Monate